














Unterschiede von Käfer-Larven

Maikäfer	Junikäfer	Gartenlaubkäfer	Rosenkäfer	Dickmaulrüssler
				
<ul style="list-style-type: none"> • Engerling bewegt sich auf glatter Oberfläche seitlich gekrümmt fort; • 2.5 – 3.5 cm gross; • Wurzelfrass an Rasen, Wiesen, Nutz- und Zierpflanzen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Engerling bewegt sich auf glatter Oberfläche seitlich gekrümmt fort; • 2.0 – 3.5 cm gross; • Wurzelfrass an Rasen, Wiesen, Nutz- und Zierpflanzen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Engerling bewegt sich auf glatter Oberfläche in Bauchlage fort; • 1.0 bis 1.5 cm gross; • Wurzelfrass an Rasen, Wiesen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Engerling bewegt sich auf glatter Oberfläche in Rückenlage fort; • 2.5 – 3.5 cm gross; • ernährt sich von abgestorbenen Pflanzenteilen (oft in Komposterde); 	<ul style="list-style-type: none"> • Larve ist beinlos & gekrümmt; • Ca. 1 cm gross; • Wurzelfrass an Nutz- und Zierpflanzen.
			<p>Unterschiede zu anderen Larven sind markant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortbewegung auf der Rückseite; • vergleichsweise kleine Beine; • vergleichsweise breiter Körper. 	<p>Unterschiede zu anderen Larven sind markant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deutlich kleiner als Engerlinge; • ohne Beine.
<p>Hinterende mit Strich</p>	<p>Hinterende mit „Mercedes-Stern“</p>	<p>Hinterende mit „Smiley“</p>		
				
<p>Käfer ist 2 – 3 cm gross</p>	<p>Käfer ist 1 – 2 cm gross</p>	<p>Käfer ist ca. 1 cm gross</p>	<p>Käfer ist 1.5 – 2 cm gross</p>	<p>Käfer ist ca. 1 – 1.5 cm gross</p>
<p>Bekämpfung der Larve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • April bis Juli & im September; <p>BEAUPRO (Bodenpilz)</p>	<p>Bekämpfung der Larve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • April bis Juli & im September; <p>METAPRO (Bodenpilz)</p>	<p>Bekämpfung der Larve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitte Juli bis Ende September; <p>NEMATODEN</p>	<p>Bekämpfung der Larve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht notwendig, da die Larve nur abgestorbene Pflanzteile verwertet! 	<p>Bekämpfung der Larve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • März bis Mai & August bis Oktober; <p>NEMATODEN</p>